

25 maart 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte ¹	0,5 L/ha	6 (bij voorkeur 2 blokken van 3 toepassingen)	5	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen

Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil (bedekte teelt)	Valse meeldauw ²	0,042% (42 mL per 100 L water)	0,5 L/ha	6 (bij voorkeur 2 blokken van 3 toepassingen)	7	3
Aubergine (bedekte teelt)	Tomatenziekte ³	0,042% (42 mL per 100 L water)	0,5 L/ha	6 (bij voorkeur 2 blokken van 3 toepassingen)	7	3
Tomaat (bedekte teelt)	Tomatenziekte ³	0,042% (42 mL per 100 L water)	0,5 L/ha	6 (bij voorkeur 2 blokken van 3 toepassingen)	7	3
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Laanbomen (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Coniferen (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-
Veredeling en zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), groentegewassen, kruiden en sierteeltgewassen (onbedekte teelt)	Takphytophthora, valse meeldauw ⁴	0,5 L/ha	0,5 L/ha	6	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

² valse meeldauw (*Pseudoperonospora cubensis*)

³ tomatenziekte (*Phytophthora infestans*)

⁴ valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

Schudden voor gebruik.

In de onbedekte teelten, m.u.v. laanbomen, mag uitsluitend neerwaarts gespoten worden.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van hoge laanbomen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende insecten/ geleedpotigen te beschermen is toepassing in de teelt van spullen en opzetters alleen toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit ten minste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van ten minste 500 centimeter gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de insteek van de sloot of de perceelsgrens.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten te beschermen is toepassing in onbedekte teelten en walk-in tunnels uitsluitend toegestaan in de periode van april tot en met 15 september.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor van nature voorkomende of uitgezette natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling. Indien u natuurlijke vijanden heeft uitgezet: raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel.

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof cyazofamid. Cyazofamid behoort tot de chemische groep cyanoimidazolen. De FRAC code is 21. Bij dit product bestaat er risico op resistentieontwikkeling. Wissel het middel af met middelen met een ander werkingsmechanisme. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.

