

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2, Ctgb, juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Druif (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ¹	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha**	6 per 12 maanden	7	14
Zaaiui (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²	4 L/ha	4 L/ha	4 per teeltcyclus	7	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Maximale dosis afhankelijk van ontwikkelingsstadium van het gewas. Voor de bloei (BBCH stadium 60) maximaal 1,5 L/ha toepassen. Vanaf begin bloei (BBCH stadium 61) tot en met 70% van de bloemkapjes (calyptra) zijn afgevallen (BBCH stadium 67) maximaal 3 L/ha toepassen. Op BBCH 68 (80% van de bloemkapjes zijn afgevallen) 4,5 L/ha toepassen.

¹Valse meeldauw (*Plasmopara viticola*)

²Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid Aannemelijk tegen	Dosering middel per toepassing*	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vezelgewassen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ¹¹	4,5 L/ha	4,5 L/ha	4	7	-
Witlof (pennenteelt) (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ¹¹	4 L/ha	4 L/ha	4	14	10
Cichorei (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ¹¹	4 L/ha	4 L/ha	4	14	10
Graszodenteelt (onbedekte teelt)	Wortelziekte ³ Antracnose ⁴ Dollar spot ⁵ Sneeuw- schimmel ⁶	3,5 L/ha	3,5 L/ha	2	7	-
Aardbei (opkweek en vermeerderingsteelt) (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Stengelbasisrot ⁷	4,5 L/ha	4,5 L/ha	4	7	-
Aardbei (opkweek en vermeerderingsteelt) (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Stengelbasisrot ⁷	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	4	7	-
Spinazie m.u.v. baby leaves (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Valse meeldauw ⁹	0,375% (375 mL in 100 L water)	3,75 L/ha	4	7	7
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ¹⁰	3 L/ha	3 L/ha	4	7	7
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ¹⁰	3 L/ha	3 L/ha	4	7	7
Mierikswortel (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ²	4 L/ha	4 L/ha	4	14	14

Toepassingsgebied	Werkzaamheid Aannemelijk tegen	Dosering middel per toepassing*	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Uien m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²	4 L/ha	4 L/ha	4	7	14
Sjalotten (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²	4 L/ha	4 L/ha	4	7	14
Bosuien (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²	4 L/ha	4 L/ha	2	7	14
Knoflook (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²	4 L/ha	4 L/ha	4	7	14
Prei (onbedekte teelt)	Papiervlekken- ziekte ¹²	4 L/ha	4 L/ha	2	7	14
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13}	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13}	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	7	-
Tulp (onbedekte teelt)	Botrytis ¹⁴	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	7	-
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13}	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	7	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13} Valse meeldauw ¹⁵	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid Aannemelijk tegen	Dosering middel per toepassing*	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Potplanten (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13} Valse meeldauw ¹⁵	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Snijbloemen (bedekte, grondgebonden teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13} Valse meeldauw ¹⁵	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Snijbloemen (bedekte, niet- grondgebonden teelt) m.u.v. walk-in tunnels	Wortelziekte ^{3, 13} Valse meeldauw ¹⁵	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Trekheesters (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13} Valse meeldauw ¹⁵	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Snijgroen (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13} Valse meeldauw ¹⁵	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Boomkwekerij- gewassen (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13} Valse meeldauw ^{15, 16} Echte meeldauw ¹⁷	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Laanbomen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Echte meeldauw ¹⁷	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Klimplanten (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13}	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid Aannemelijk tegen	Dosering middel per toepassing*	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13} Valse meeldauw ¹⁶	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13}	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Heide soorten (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13}	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Valse meeldauw ¹⁵ Echte meeldauw ¹⁷	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Vruchtbomen en - struiken (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Valse meeldauw ¹⁵ Echte meeldauw ¹⁷ Schurft ¹⁸	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13} Valse meeldauw ¹⁵	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte ^{3, 13} Valse meeldauw ¹⁵	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ¹⁵	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid Aannemelijk tegen	Dosering middel per toepassing*	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Valse meeldauw ¹⁵	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ¹⁵	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Valse meeldauw ¹⁵	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Gazon	Wortelziekte ³ Antracnose ⁴ Dollar spot ⁵ Sneeuw- schimmel ⁶	3,5 L/ha	3,5 L/ha	2	7	-
Greens van golfterreinen	Wortelziekte ³ Antracnose ⁴ Dollar spot ⁵ Sneeuw- schimmel ⁶	3,5 L/ha	3,5 L/ha	2	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

² Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

³ Wortelziekte (*Pythium* spp.)

⁴ Antracnose (*Colletotrichum cereale*)

⁵ Dollar spot (*Sclerotinia homoeocarpa*)

- ⁶ Sneeuwschimmel (*Microdochium nivale*)
- ⁷ Stengelbasisrot (*Phytophthora cactorum*)
- ⁸ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)
- ⁹ Valse meeldauw (*Peronospora farinosa*)
- ¹⁰ Valse meeldauw (*Hyaloperonospora brassicae*)
- ¹¹ Echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)
- ¹² Papiervlekkenziekte (*Phytophthora porri*)
- ¹³ Wortelziekte (*Phytophthora* spp.)
- ¹⁴ Botrytis (*Botrytis tulipae*)
- ¹⁵ Valse meeldauw (*Basidiophora entospora*)
- ¹⁶ Valse meeldauw (*Peronospora sparsa*)
- ¹⁷ Echte meeldauw (*Sphaerotheca* spp.)
- ¹⁸ Schurft (*Venturia inaequalis*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Draag handschoenen bij werkzaamheden in druiven.

Behandelde vezelgewassen en bijproducten zoals lijnzaad niet voor menselijke en/of dierlijke consumptie bestemmen.

In de onbedekte teelt van vezelgewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, bloembollen en bloemknollen (m.u.v. lelie), tulp, bolbloemen en knolbloemen, heide soorten, vaste plantenteelt, gazon, en greens van golfterreinen het middel toepassen in 400 tot 600 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van bloemkoolachtigen, bladkoolachtigen, mierikswortel, uien, sjalotten, bosuien, knoflook en prei toepassen in 400-800 liter water per ha.

In de bedekte teelt van spinazie, en vaste plantenteelt het middel toepassen in 400 tot 1000 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van aardbei, druiven, bloemisterij gewassen, laanbomen, klimplanten, sierheesters (incl. rozen), coniferen (incl. kerstbomen), bos- en haagplantsoen en vruchtbomen en -struiken en in de bedekte teelt van aardbei, bloembol- en bloemknolgewassen, potplanten, snijbloemen (grondgebonden), snijbloemen (niet grondgebonden), trekheesters, boomkwekerijgewassen het middel toepassen in 400 tot 1200 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van tulp het middel na de bloei / na het koppen (BBCH 65-97) toepassen.

Toepassing in druif is uitsluitend toegestaan tot 80 procent van de bloemkapjes (calyptra) zijn afgevallen (BBCH 68).

Let op: dit middel preventief of bij lage infectiedruk toepassen.