

Actueel WG van het middel Valcure, 16536 N

2 juni 2023

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Grondbehandeling voor uitplanten	Kiem- en bodemschimmels ^{2,3,5,8}	2-5 L/ha	8	7
	Druppelbehandeling of aangieten				
Sla (bedekte teelt)	Grondbehandeling voor opkomst/uitplanten	Kiem- en bodemschimmels ^{1,2,3,4,5,6,7}	2-5 L/ha	8	7
	Veurbehandeling				
	Druppelbehandeling of aangieten				
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae eetbare schil (bedekte teelt)	Grondbehandeling voor uitplanten	Kiem- en bodemschimmels ^{1,2,3,4,5,6,7}	2-5 L/ha	8	7
	Veurbehandeling				
	Druppelbehandeling of aangieten				
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet eetbare schil (bedekte teelt)	Grondbehandeling voor uitplanten	Kiem- en bodemschimmels ^{1,2,3,4,5,6,7}	2-5 L/ha	8	7
	Veurbehandeling				
	Druppelbehandeling of aangieten				
Vruchtgroenten van Solanaceae (bedekte teelt)	Grondbehandeling voor uitplanten	Kiem- en bodemschimmels ^{1,2,3,4,5,6,7}	2-5 L/ha	8	7
	Veurbehandeling				
	Druppelbehandeling of aangieten				

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aromatische kruidgewassen (bedekte teelt)	Grondbehandeling voor opkomst/uitplanten	Kiem- en bodemschimmels ^{1,2,3,4,5,6,7}	2-5 L/ha	8	7
	Veurbehandeling				
	Druppelbehandeling of aangieten				
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Grondbehandeling voor opkomst/uitplanten	Kiem- en bodemschimmels ^{1,2,3,4,5,6,7}	2-5 L/ha	8	7
	Veurbehandeling				
	Druppelbehandeling of aangieten				

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ *Pythium* spp.

² *Rhizoctonia* spp.

³ *Fusarium* spp.

⁴ *Phoma* spp.

⁵ *Phytophthora* spp.

⁶ *Sclerotinia* spp.

⁷ *Verticillium* spp.

⁸ *Colletotrichum* spp.

Overige toepassingsvoorwaarden

De behandelingen toepassen met 1000-10000 liter water per ha.

Bevat *B. amyloliquefaciens* D747. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Gewasgevoeligheid

Let op: De veiligheid van het middel is gedemonstreerd op een beperkt aantal sierteeltsoorten en variëteiten. Hoewel schade aan andere soorten en variëteiten hoogstwaarschijnlijk niet zal voorkomen bij normaal gebruik, is het toch aan te raden om het product te testen op een klein aantal planten alvorens een groot aantal planten van een nieuwe variëteit te behandelen voor de eerste keer.

