Setanta flo, 14233 N W.2

Datum dagtekening besluit 23 sept 2026

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Sla; *Lactuca spp* (onbedekte teelt)	Voor opkomst of na planten	Zwarte nachtschade[1]	1,75 l/ha	1 per teeltcyclus	30
Andijvie (onbedekte teelt)	Voor opkomst of na planten	Zwarte nachtschade[1]	1,875 l/ha	1 per teeltcyclus	30

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

[1] *Solanum nigrum*

Het gebruik in de teelt van witlof (pennenteelt) en cichorei is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Witlof (pennenteelt)	Voor opkomst, na opkomst	Eenjarige onkruiden	1,75 l/ha	1 per teeltcyclus
Cichorei	Voor opkomst, na opkomst	Eenjarige onkruiden	1,875 l/ha	1 per teeltcyclus

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

In verband met residuen in volggewassen, binnen 30 dagen na toepassing geen sla, andijvie of veldsla telen en binnen 180 dagen na toepassing geen overige voedsel- of voedergewassen telen.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel op zijn vroegst in het 3e kalenderjaar na de laatste toepassing op hetzelfde perceel worden toegepast, waarbij in de tussenliggende periode ook geen andere middelen op basis van propyzamide mogen worden toegepast.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in de periode van 1 september tot 1 maart in de onbedekte teelt van:
- sla
- andijvie
- witlof (pennenteelt)
- cichorei

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.