Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb, juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen of per teeltcyclusper 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Pitvruchten (onbedekte teelt)	Schurft[18]	0,45% (450 ml in 100 L water)	6,8 L/ha	10 per 12 maanden	7	15
Druif (onbedekte teelt)	Valse meeldauw[1]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha**	6 per 12 maanden	7	14
Zaaiui (onbedekte teelt)	Valse meeldauw[2]	4 L/ha	4 L/ha	4 per teeltcyclus	7	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
** Maximale dosis afhankelijk van ontwikkelingsstadium van het gewas. Voor de bloei (BBCH 60) maximaal 1,5 L/ha toepassen. Vanaf begin bloei (BBCH 61) tot en met 70% van de bloemkapjes (calyptra) zijn afgevallen (BBCH 67) maximaal 3 L/ha toepassen. Op BBCH 68 (80% van de bloemkapjes zijn afgevallen) 4,5 L/ha toepassen.
[1] Valse meeldauw (*Plasmopara viticola*);
[2] Valse meeldauw (*Peronospora destructor*);
[18] Schurft (*Venturia inaequalis, Venturia pyrina*).

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te

voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vezelgewassen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw [11]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	4	7	-
Witlof (pennenteelt) (onbedekte teelt)	Echte meeldauw [11]	4 L/ha	4 L/ha	4	14	10
Cichorei (onbedekte teelt)	Echte meeldauw [11]	4 L/ha	4 L/ha	4	14	10
Graszodenteelt (onbedekte teelt)	Wortelziekte [3] Antracnose [4] Dollar spot [5] Sneeuw-schimmel [6]	3,5 L/ha	3,5 L/ha	2	7	-
Aardbei (opkweek en vermeerderingsteelt) (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Stengelbasisrot [7]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	4	7	-
Aardbei (opkweek en vermeerderingsteelt) (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Stengelbasisrot [7]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	4	7	-
Spinazie m.u.v. baby leaves (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Valse meeldauw [9]	0,375% (375 mL in 100 L water)	3,75 L/ha	4	7	7
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw [10]	3 L/ha	3 L/ha	4	7	7
Bladkoolachtigen (onbedekte teelt)	Valse meeldauw [10]	3 L/ha	3 L/ha	4	7	7
Mierikswortel (onbedekte teelt)	Echte meeldauw [2]	4 L/ha	4 L/ha	4	14	14

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Uien m.u.v. zaaiui (onbedekte teelt)	Valse meeldauw [2]	4 L/ha	4 L/ha	4	7	14
Sjalotten (onbedekte teelt)	Valse meeldauw [2]	4 L/ha	4 L/ha	4	7	14
Bosuien (onbedekte teelt)	Valse meeldauw [2]	4 L/ha	4 L/ha	2	7	14
Knoflook (onbedekte teelt)	Valse meeldauw [2]	4 L/ha	4 L/ha	4	7	14
Prei (onbedekte teelt)	Papiervlekken-ziekte [12]	4 L/ha	4 L/ha	2	7	14
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	7	-
Tulp (onbedekte teelt)	Botrytis [14]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	7	-
Bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	7	-
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13] Valse meeldauw [15]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Potplanten (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13] Valse meeldauw [15]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Snijbloemen (bedekte, grondgebonden teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13] Valse meeldauw [15]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Snijbloemen (bedekte, niet-grondgebonden teelt) m.u.v. walk-in tunnels	Wortelziekte [3, 13] Valse meeldauw [15]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Trekheesters (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13] Valse meeldauw [15]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Snijgroen (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13] Valse meeldauw [15]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Boomkwekerij-gewassen (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13] Valse meeldauw [15, 16] Echte meeldauw [17]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Laanbomen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Echte meeldauw [17]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Klimplanten (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Sierheesters incl. rozen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13] Valse meeldauw [16]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Heide soorten (onbedekte teelt incl walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Valse meeldauw [15] Echte meeldauw [17]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Vruchtbomen en - struiken (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Valse meeldauw [15] Echte meeldauw [17] Schurft [18]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt incl. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13] Valse meeldauw [15]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Vaste plantenteelt (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Wortelziekte [3, 13] Valse meeldauw [15]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Valse meeldauw [15]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Valse meeldauw [15]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, mais, granen en graszaadteelt, hop	Valse meeldauw [15]	4,5 L/ha	4,5 L/ha	3	14	-

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
en olifantsgras (onbedekte teelt)						
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt m.u.v. walk-in tunnels)	Valse meeldauw [15]	0,375% (375 mL in 100 L water)	4,5 L/ha	3	7	-
Gazon	Wortelziekte [3] Antracnose [4] Dollar spot [5] Sneeuw-schimmel [6]	3,5 L/ha	3,5 L/ha	2	7	-
Greens van golfterreinen	Wortelziekte [3] Antracnose [4] Dollar spot [5] Sneeuw-schimmel [6]	3,5 L/ha	3,5 L/ha	2	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

[2] Valse meeldauw (*Peronospora destructor)*
[3] Wortelziekte (*Pythium* spp.)
[4] Antracnose (*Colletotrichum cereale*)
[5] Dollar spot (*Sclerotinia homoeocarpa*)
[6] Sneeuwschimmel (*Microdochium nivale*)
[7] Stengelbasisrot (*Phytophthora cactorum*)
[8] Valse meeldauw (*Bremia lactucae)*
[9] Valse meeldauw (*Peronospora farinosa)*
[10] Valse meeldauw (*Hyaloperonospora brassicae)*
[11] Echte meeldauw (*Golovinomyces cichoracearum*)
[12] Papiervlekkenziekte (*Phytophthora porri*)
[13] Wortelziekte (*Phytophthora* spp.)
[14] Botrytis (*Botrytis tulipae*)
[15] Valse meeldauw (*Basidiophora entospora*)

[16] Valse meeldauw (*Peronospora sparsa*)
[17] Echte meeldauw (*Sphaerotheca* spp.)
[18] Schurft (*Venturia inaequalis*)

Overige toepassingsvoorwaarden
Draag handschoenen bij werkzaamheden aan druiven.

Behandelde vezelgewassen en bijproducten zoals lijnzaad niet voor menselijke en/of dierlijke consumptie bestemmen.

In de teelt van pitvruchten het middel toepassen in minimaal 500 liter water per ha.
In de teelt van pitvruchten het middel toepassen van het zwellen van de bloemknoppen (BBCH 51) tot gevorderde rijping, cultivar specifieke kleuring (BBCH 85).

In de teelt van druif is toepassing uitsluitend toegestaan tot 80 procent van de bloemkapjes (calyptra) zijn afgevallen (BBCH 68).

In de onbedekte teelt van vezelgewassen, witlof (pennenteelt), cichorei, bloembollen en bloemknollen (m.u.v. lelie), tulp, bolbloemen en knolbloemen, heide soorten, vaste plantenteelt, gazon, en greens van golfterreinen het middel toepassen in 400 tot 600 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van bloemkoolachtigen, bladkoolachtigen, mierikswortel, uien, sjalotten, bosuien, knoflook en prei toepassen in 400-800 liter water per ha.

In de bedekte teelt van spinazie, en vaste plantenteelt het middel toepassen in 400 tot 1000 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van aardbei, druiven, bloemisterij gewassen, laanbomen, klimplanten, sierheesters (incl. rozen), coniferen (incl. kerstbomen), bos- en haagplantsoen en vruchtbomen en -struiken en in de bedekte teelt van aardbei, bloembol- en bloemknolgewassen, potplanten, snijbloemen (grondgebonden), snijbloemen (niet grondgebonden), trekheesters, boomkwekerijgewassen het middel toepassen in 400 tot 1200 liter water per ha.

In de onbedekte teelt van tulp het middel na de bloei / na het koppen (BBCH 65-97) toepassen.

Let op: in de teelt van zaaiuien dit middel preventief of bij lage infectiedruk toepassen.

Let op: Werkzaamheid tegen schurft op fruit kan onvoldoende zijn.

Let op: Het effect van het middel op fermentatie in pitvruchten is niet onderzocht.